
La tuberculose cutanée : toujours un problème d'actualité et de santé publique en Algérie : à propos de 7 observation récentes

Omar Boudghene Stambouli*¹

¹BOUDGHENE STAMBOULI OMAR – Université ABOUBAKR BELKAID FACULTE DE MEDECINE LABORATOIRE TOXICOMED 32 SERVICE DE DERMATO CHU DE TLEMCCEN ALGERIE, Algérie

Résumé

Introduction: la tuberculose cutanée et extra cutanée connaît une recrudescence ces dernières années ; non seulement dans les pays en voie de développement mais également dans les pays développés.

Matériel et Méthodes: nous rapportons sept cas de tuberculoses cutanées observées dans notre service de juillet 2011 à mai 2012.

Observations: il s'agit de sept cas de tuberculose faits de, trois lupus tuberculeux, deux gommages, un scrofuloderme et un érythème induré de Bazin. Le sexe féminin était retrouvé dans six cas sur sept, la vaccination était positive dans Cinque cas sur sept, avec cicatrice de vaccination positive que chez trois patients.

Résultats: Les Intradermoréactions à la tuberculine étaient toutes positives avec deux cas phlyctenulaires , elle n'a pas été réalisée chez une patiente chez qui le bacille de Koch était positif.

Discussion: Le bacille de Koch n'a été retrouvé que dans un seul cas (gomme tuberculeuse, la patiente était diabétique).

Les localisations extra cutanées n'ont été trouvées que dans deux cas (scrofuloderme et gomme tuberculeuse). La notion de contagion était trouvée dans deux cas. Les patients ont été mis soit sous triple ou quadruple antituberculeux avec évolution très favorable, mis à part un cas décédé (gomme tuberculeuse) à la suite d'un trouble du rythme cardiaque (antécédent de cardiopathies ischémiques).

En moins d'une année, 7 cas de tuberculoses cutanées sont observés. La tuberculose est toujours d'actualité et pose un problème de santé publique car elle touche toutes les catégories de la population en Algérie. Le bacille de Koch n'a été retrouvé que dans un seul cas (gomme tuberculeuse, la patiente était diabétique). Les localisations extra cutanées n'ont été trouvées que dans deux cas (scrofuloderme et gomme tuberculeuse). La notion de contagion était trouvée dans

*Intervenant

deux cas. Les patients ont été mis soit sous triple ou quadruple antituberculeux avec évolution très favorable, mis à part un cas décédé (gomme tuberculeuse) à la suite d'un trouble du rythme cardiaque(antécédent de cardiopathies ischémiques). En moins d'une année, 7 cas de tuberculoses cutanées sont observées. La tuberculose est toujours d'actualité et pose un problème de santé publique car elle touche toutes les catégories de la population en Algérie. **Conclusion:** nous observons ces dernières années une recrudescence de la tuberculose cutanée, un diagnostic plus précoce, un traitement bien conduit, un dépistage de masse et une meilleure disponibilité des antituberculeux permettra d'en réduire considérablement les cas.

Mots-Clés: Endémicité, recrudescence, Santé publique